

Corrigenda ad Ann. Naturhist. Mus. Wien, (B) 87

S. 195:

Tabelle 1: Vorkommen der nachgewiesenen Helminthenarten in den Wirten *T. alpestris* und *R. temporaria*.

	<i>T. filiformis</i>	<i>O. brevicaudatum</i>	<i>C. commutata</i>	<i>C. ornata</i>	<i>C. longicauda</i>	<i>O. filiformis</i>	<i>R. bufonis</i>	<i>E. squamula</i>	<i>G. ?alobata</i>	<i>H. cylindracea</i>	<i>O. ranae</i>	<i>P. integerrimum</i>
<i>R. temporaria</i>	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+
<i>T. alpestris</i>	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-

S. 260:

Tafelerklärung

Fig. 1: Oberes Tier: *Potamon (Potamon) potamios aspöcki*, Holotypus. – Unteres Tier: *Potamon (Potamon) potamios schönmanni*, Holotypus. Verkleinert.

Fig. 2: *Potamon (Pontipotamon) ibericum tauricum*, Kopula (Freilandaufnahme) Insel Thassos, Dr. KRITSCHER phot. ca. $\frac{1}{2} \times$.

S. 262:

Die Skizze gehört um etwa 100° gegen den Uhrzeigersinn gedreht.

S. 263:

Fig. 1, 2: nat. gr.

Die Schriftleitung